

מהם ניתוחים פרוקטולוגיים והשימושים שלהם?

הפרעות במערכת העיכול מטופלות בצורה הטובה ביותר בניתוחים פרוקטולוגיים הכרוכים בבדיקה גופנית של האבחנה המוקדמת של הבעיות.

ניתוחים פרוקטולוגיים משמשים לטיפול בהפרעות בדרכי העיכול כולל פי הטבעת והפי הטבעת. המסך מורכב מהמעי הגס, פי הטבעת, התעלה האנאלית והאזור הפריאנאלי. חלק מהמצבים הרפואיים הנפוצים בדרכי המעי כוללים:

מורסות ופיסטולות: אלה הם סוג של זיהום קרוב לפי הטבעת ולפי הטבעת.

תגי עור אנאליים: מדובר בליטות עור קטנות שנמצאות קרוב לפי הטבעת.

סרטן המעי הגס והרקטום: הוא מתחיל במעי הגס או בפי הטבעת ומתפשט לחלקים האחרים בגוף.

מצב רפואי זה כולל היווצרות של כיסים באזורים חלשים לאורך דרכי העיכול: Diverticulitis.

סדקים: מדובר בדמעות קטנות שנמצאות ברירת הפנימית של האנאלי.

טחורים: מצב רפואי זה כולל ורידים נפוחים סביב פי הטבעת והוא עלול להתרחש באופן פנימי או חיצוני.

זוהי קבוצה של הפרעות דלקתיות הכוללות קוליטיס כיבית ומחלת קרוהן (IBD) מחלת מעי דלקתית.

זו קבוצה של תסמיני מעיים כמו נפיחות, התכווצויות, עצירות ושלוש (IBS) תסמונת המעי הרגיז.

פוליפים: זה מוגדר טוב יותר כצמיחה טרום סרטנית שיכולה להתפתח לסרטן המעי הגס.

צניחת פי הטבעת: זהו מצב רפואי בו פי הטבעת מתחיל ליפול לפתח האנאלי.

אנשים הסובלים מהפרעות במערכת העיכול צריכים לקחת ייעוץ כירורגי לטיפול בבעיותיהם. הפרעות אלה עלולות להתפתח לבעיות קשות שעלולות להקשות על החיים בטווח הרחוק. אך ניתן לטפל בהם בהליכים כירורגיים כמו הדברים הבאים.

אנוסקופיה: הנוהל מסייע במציאת הפרעות בפי הטבעת ובפי הטבעת.

קולונוסקופיה: זהו הקרנת המעי הגס כולו לעקבות של סרטן המעי הגס. כמו כן, ניתן להסיר את הפוליפים.

בחינות פי הטבעת דיגיטליות: מנתח בוחן את פי הטבעת והערמונית התחתונים באמצעות אצבעותיהם.

אולטרסאונד אנדורקטלי: זהו מבחן הדמיה שנערך לאיתור סרטן המעי הגס.

פרוקטוסקופיה: ההליך כרוך בבדיקה גופנית של פי הטבעת והפי הטבעת, נטילת רקמות לביופסיה והסרת פוליפים.

ההליך כרוך בבדיקה של השליש התחתון של המעי הגס. זה נקרא המעי הגס הסיגמואידי: Sigmoidoscopy.

ההתקדמות בטכנולוגיה רפואית הקלה על מנתחים לבצע נהלים כירורגיים עם מינימום פלישה. אבחון מהיר של מחלות קריטיות כולל סרטן התאפשר גם הוא.

אם יש לך גירוד אנאלי או שריפה, כאבי אנאלי או פי הטבעת, יבלות אנאלי או דימום, עליך ללכת **למרפאה כירורגית** לאבחון וטיפול. עדיף לאבחן את ההפרעה בשלב המוקדם שלה כך שהטיפול מהיר ופורה יותר.