

כאשר ניתוח בקע מפשעתי מתקרב

אין הרבה מה לדאוג לקע מפשעתי מכיוון שזה לא דחיפות רפואית. תזדקק לטיפול רפואי מהיר רק כאשר הבעיה מחמירה.

בקע מפשעתי מתרחש באזור המפשעה במעבר הנקרא תעלת מפשעתי. זה מרגיש כמו בליטה משני צדי עצם האגן. זה קורה כאשר רקמת הבטן דוחפת דרך פתח בדופן הבטן התחתונה. אם יש לך בליטה באזור המפשעה שלך, אתה אמור לראות [מומחה לניתוח בקע](#).

מתי לראות מומחה בקע

אין הרבה מה לדאוג לבעיה עד להתפתחות הסיבוכים. בקע מפשעתי אינו בהכרח מסוכן. זה לא צומח מעצמו אבל זה יכול להיות מסכן חיים בטווח הרחוק. לכן, לא רצוי להתעלם מהבעיה במשך זמן רב. מה שאתה צריך לעשות זה להמשיך לצפות בצמיחת בקע ולקבל טיפול רפואי ברגע שזה מתחיל לתת בעיות.

ניתוח בקע מפשעתי אינו דחוף אם לקע אין זיהום או מצב של כליאה. במילים אחרות, אם אין לך כאב בבליטה, הרופא שלך יכול לבקש ממך לחכות זמן מה. או שתוכל לבקש מהמנתח לפעול על בקע מסיבות אסתטיות. הבליטה יכולה לקלקל את המראה שלך ומכאן שעדיף לדחוף את הרקמה הבולטת בחזרה לבטן שלך.

מהם הסימפטומים של סיבוכי בקע

בליטה משני צדי עצם האגן עם תחושה בוערת או כואבת היא הסימן הראשון של בקע מפשעתי. אתה יכול להרגיש תחושת כוואבים או גוררים במפשעה שלך כתוצאה מהבליטה. ובכל פעם שהמעיי הבולט יורד לשק האשכים, תרגישו כאב ונפיחות סביב האשכים.

ניתוח בקע מפשעתי מתקרב כאשר התסמינים מתחילים להחמיר כמו שיש לך בחילה או הקאות או שניהם. או שיש לך כאבים פתאומיים שמתעצמים במהירות. או שיש לך בעיה בתנועת המעי או בחולפת בגז.

מה קורה במהלך ניתוח בקע

ניתוח בקע מבוצע בשתי דרכים - פתוח ומינימלי. הנוהל כרוך בגישה לבליטת בקע דרך חתך, דחיפת המעי הבולט בחזרה לבטן וסגירת דופן הבטן ברשת כירורגית. לאחר הניתוח, אתה יכול לחזור לחיים נורמליים לאחר מנוחה למשך מספר ימים.

תן למומחה לניתוח בקע לבחון את מצבך הרפואי ולחוות דעה בשאלה אם הניתוח קרוב. במידת הצורך, המנתח יפעל על בליטת בקע שלך וידחוף אותו חזרה לשגרה. דופן הבטן ייסגר עם רשת כירורגית.

למידע נוסף בקר בכתובת <https://drbardslava.com/>